

## 問診表

眼瞼下垂の症状で受診された方へ ( )

この問診票では、適切な診断と治療を行うため、目の状態などをお伺いすることを目的としています。  
ご記入をお願いします。差し支えない範囲でご記入をお願いいたします。

お名前

1. 自覚症状について、教えてください。(複数選択可)

- 目が開きにくい
- まぶたが重い
- まぶたが下がって見えづらい
- まぶたが下がってきて見た目が以前と変わってしまった
- 視界を確保するために、あごを上げたりまゆ毛を上げてしまう
- 肩こり、頭痛、眼精疲労が強い
- 二重の幅が広がってきた
- 指でまぶたをあげると見やすくなる
- その他 ( )

2. その症状いつからですか? ( )

3. まぶたが下がる症状は、時間帯や日によって違いがありますか?

- 時間帯や日によって違いはない
- 時間帯や日によって違いがある
- 夕方になったらまぶたが下がってくる
- 日によってまぶたの下がり方が違う
- その他 ( )

4. 以下の既往歴はありますか?

- 脳卒中. 脳動脈瘤. 動眼神経麻. ホルネル症候群 重症筋無力症
- 外眼筋麻痺 目の感染症 目の奥の腫瘍. 頭の腫瘍 目の怪我 顔面神経麻痺

5. 口手術歴なし

- 手術歴あり. どのような手術を受けましたか?( )

6.

- コンタクトレンズの使用歴なし
- ハードコンタクトレンズの使用歴あり 使用 年間
- ソフトコンタクトレンズの使用歴あり 使用 年間

7. 眼瞼下垂について詳しく知りたいことがありましたら、該当する内容を選択してください。

- 疾患について ご自身が眼瞼下垂であるかどうか 治療方法
- その他( )

ご記入ありがとうございました。 佐々木眼科

# 説明書

「アップニーク®ミニ点眼液0.1%」による治療に対する説明書

## 1.疾患の説明とあなたが受ける治療

- アップニーク®ミニ点眼液0.1%（以下、本剤）は後天性眼瞼下垂の治療薬です。
- 後天性眼瞼下垂は、加齢などのさまざまな原因によって上まぶたの筋肉の力が伝わりにくくなることで、引き起こされます。

## 2.有効成分

- 本剤はオキシメタゾリン塩酸塩を主成分とする点眼剤です。

## 3.効能・効果

- 本剤は、まぶたを上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させることで、まぶたを上げます。

## 4.、副作用

- 副作用として、まぶたのかゆみが報告されています。
- これらの症状、その他、異常を感じたときは、できるだけ早く医師に相談してください。

## 5.用法・用量（この薬の使い方）

1. 通常、成人には、1回1滴を1日1回点眼します。必ず指示された使用方法に従ってください。
2. 点眼し忘れた場合は、その日のうちであれば、すぐに1回分点眼してください。  
※翌日に気づいた場合には、前日の分は点眼せず、1回1滴を1日1回点眼してください。  
※1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼したりしてはいけません。

## 6.治療を受ける際の注意点

### 【治療開始前】

- 次の人は、注意が必要です。治療開始前に、医師や薬剤師に伝えてください。
  - ▶以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
  - ▶心臓や血管の疾患がある
  - ▶閉塞隅角緑内障である
  - ▶妊娠または妊娠している可能性がある
  - ▶授乳中である
  - ▶他に薬を使っている

### 【治療中】

- 点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。症状が生じた場合は、症状が回復するまでは自転車や自動車などの運転、機械の操作は行わないでください。  
必要に応じてサングラスをかけるなど、太陽の光や強い光を直接見ないようにしてください。
  1. 治療期間中は、眼瞼下垂の症状を確認するため、定期的に受診してください
  2. 効果は、通常翌日には消失しますので、継続して点眼する必要があります

## 7.自由診療に伴う注意事項

1. 本剤による後天性眼瞼下垂治療は自由診療であり公的医療保険の対象ではありません。
2. 本剤による治療中の後天性眼瞼下垂に関する診察は、公的医療保険は適用されず自費の診療となります。
3. 本剤により副作用が起こった場合、副作用に係る治療費につきましても公的医療保険は適用されず自費の診療となります。

本剤の副作用等で治療を中止した場合、一旦処方した点眼薬については原則として返品・返金に応じる事はできません。